Observation N. 59 B

Sur une contusion du Perioste

De Lb de la Cuisse N.° 10.

Au mois de May 1733 je vis un homme agé de 28 ans, qui avoit la cuisse droitte une fois plus grosse que dans l'état naturel; Elle avoit aquis ce volume par degrés depuis trois ans, que le jeune homme etant a cheval etoit tombé, et le cheval sur la cuisse: on avoit deja mis en usage tout ce qu'on avoit cru capable de diminuer la grosseur enorme de ce membre et la tention douloureuse qui l'accompagnoit mais inutilement, en sorte qu'on regarda la maladie comme un gonflement de presque tout le femur, pour lequel il n'y auroit que l'Amputation a pratiquer au cas qu'elle fus possible. Je tentay a mon tour la guerison de

ARC 39 n° 120

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

cette maladie, et aprés avoir mis le malade
a un regime de vivre convenable, je le
fis saigner trois fois au bras, il fus purger
et on pansa la cuisse avec des cataplasmes
Emollients, auxquels on ajouta ensuitte
les resolutifs; au bout de quinze Jours
le malade se plaignit de douleurs
lancinantes dans la partie superieure interne
de la cuisse, alors soubconnant la
supuration je substituay les maturatifs
aux resolutifs dans l'usage des cataplasmes
Quelques Jours aprés je sentis une ondulation
profonde je portay le bistoury jusqu'à la
matiére epanchée, j'introduisis ensuitte
le doigt dans l'ouverture, et aussi tost il
en sortis prés de trois demi septiers de pus
assés loüable, malgré que l'os fus decouvert,
on pansa la playe en premier appareil
avec des lambeaux de linge &c. Dans les
pansemens suivans, les premiers bourdonnets

furent liés d'un fil et portés sur l'os, ils étoient trempés dans une liqueur spiritueuse pour le garentir de l'impression de l'air et de la supuration, le reste des bourdonnets et des plumaceaux fut couvert de digestif et on continua le cataplasme sur toute la cuisse. La Playe supura assés abondamment pendant huit jours, malgré cela un nouveau depôt s'anonça par des elancemens a la partie antérieure et presqu'inferieure de la cuisse, je plongeai le bistouri dans le corps charnu des muscles greste anterieur et crural (qui cependant étoient trés sains) et quoi que l'os se trouva encore decouvert il en sortit du pus aussi louable que de la premiere ouverture; La Playe fut pansée de même, la supuration fut abondante, et quand elle commença a diminuer on fit des injections avec une decoction vulneraire et detersive qui passoit d'une playe a l'autre; En moins de six semaines la cuisse perdit son

volume Extraordinaire, l'os se recouvrit de bonnes chairs, sans exfoliation sensible, et le malade fut entierement guerj en soixante et trois jours.

Il y a lieu de croire que dans cette chûte le perioste a eté contus dans toute son etenduë, et qu'il s'est fait une infiltration de la partie rouge du sang dans les feuillets qui le composent, c'est sans doute ce qui a causé les douleurs profondes que le malade a ressentj si longtemps, et cette infiltratiôn augmentant le volume du perioste a consequemment augmenté celuj de toute la cuisse en ralentissant la circulatiôn des liqueurs ; Il est etonnant que l'os se soit trouvé sain dans une telle maladie car le perioste a suppuré dans presque toute son Etenduë, l'os s'en est trouvé depouillé et cependant sans alteratiôn du moins n'en aij-je apercu aucune. /.

Boudou

Académie nationale de médecine · Bibliothèque